

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "des Pays de la Loire"

Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Sarthe, Vendée, Mayenne

SERVICE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative rue Dupetit-Thouars 49043 ANGERS CEDEX

Téléphone n° 66.21.32 Poste 571

DLP 26 - 6 - 79138658

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F.

Régisseur des recettes DDA
C. C. P. 8604-02 Nantes

BULLETIN N° 163 de JUIN 1979

TOUS DEPARTEMENTS

P. 1

VIGNE

MILDIOU -

Dans l'ensemble, cette affection reste très limitée dans son développement; les foyers sont encore rares, sauf dans les vignobles de Vendée. Dans tous les vignobles, il y a lieu de terminer le traitement conseillé dans le bulletin du 13 Juin.

Terminer les ébourgeonnages.

VERS DE LA GRAPPE -

Les vols de la *Cobhyllis* et de l'*Eudémis* sont pratiquement terminés et aucune ponte récente n'a eu lieu. Sauf localement, dans les zones habituellement contaminées par la *Cochylis*, les toiles sont peu nombreuses. Les éléments de la note du 13 Juin se trouvent donc confirmés.

OIDIUM -

Cette maladie reste encore localisée aux parcelles très attaquées en 1978. Aucune intervention spécifique ne se justifie. La Station donnera prochainement de nouvelles informations.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMMES -

Le vol se poursuit dans l'ensemble des régions et les conditions climatiques sont devenues plus favorables au développement de cet insecte.

Dans les vergers des départements du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique (sauf le Nord), de la Vendée, du Sud de la Sarthe et du Sud de la Mayenne, il y a lieu de terminer le traitement conseillé dans le bulletin du 13 Juin.

Dans les vergers du Nord des départements de la Sarthe et du Nord de la Mayenne, une première intervention devra être exécutée dans les premiers jours de la semaine du 25 au 30 Juin. Dans les vergers du Nord de la Loire-Atlantique, cette intervention pourra être repoussée au milieu de la semaine du 25 au 30 Juin.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER -

Les projections d'ascospores sont complètement terminées dans toutes les régions, mais des taches sont encore susceptibles d'apparaître, jusque dans les derniers jours de Juin. Par conséquent, dans les vergers où un traitement anti-carpocapse doit être exécuté et où la maladie a été observée, on aura intérêt à effectuer un traitement mixte.

OIDIUM DU POMMIER -

Les arboriculteurs devront continuer de se méfier de cette affection. Sur les variétés sensibles qui doivent recevoir un traitement, la protection contre l'*Oïdium* doit être assurée.

PUCERONS, ARAIGNEE ROUGE -

L'activité de ces parasites demeure faible, sauf localement et une intervention contre eux ne doit être exécutée que si elle se justifie.

Les pullulations de cet insecte sont rares et très locales. Aucune intervention généralisée ne se justifie.

POMMES DE TERREMILDIOU -

Dans le Nord de la Loire-Atlantique, de la Sarthe et de la Mayenne, ainsi que dans l'Ouest de ce dernier département, il y a lieu de terminer le traitement conseillé dans le bulletin du 13 Juin.

Par contre, dans les départements de Maine-et-Loire et de la Vendée, ainsi que dans le Sud de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-Atlantique, il est trop tôt pour intervenir.

DORYPHORE -

Les premières larves sont apparues; elles sont souvent peu nombreuses. Une intervention, qui pourrait être mixte avec celle contre le Mildiou dans les régions concernées par ce traitement, ne se justifie que dans les parcelles où les populations sont suffisamment importantes.

CEREALESBLE -PUCERON DE L'EPI -

Le puceron de l'épi est présent dans la plupart des cultures mais ses populations sont extrêmement faibles.

Les températures basses d'Avril, de Mai et de la première quinzaine de Juin ont en effet été défavorables à son développement et ont interdit ses pullulations. Le puceron de l'épi est dangereux, de l'épiaison au stade pâteux; passé ce stade, il quitte les épis qui ne peuvent plus le nourrir.

La végétation est actuellement très rapide et toutes les variétés sont défleuries. En conséquence, il est inutile de traiter contre le puceron de l'épi.

SEPTORIOSE -

Il est trop tard pour intervenir contre cette maladie, en raison de l'état avancé de la végétation. En effet, après la floraison, les traitements fongicides ne sont plus rentables.

ROUILLES -

Ces maladies sont extrêmement rares.

OIDIUM -

Cette maladie est en légère progression. Toutefois, il n'y a pas lieu d'intervenir contre elle.

ORGES D'HIVER et DE PRINTEMPS -

Aucune intervention ne se justifie contre les maladies de ces céréales.

MODIFICATION APPORTEE A LA REVUE PHYTOMA

Vous avez pu constater les récentes modifications apportées dans la présentation de la revue Phytoma, portant sur le format, la qualité du papier et l'utilisation de la couleur. Ces améliorations ont pour double but de rendre plus agréable et plus aisée la lecture d'une revue bien connue des abonnés aux avertissements agricoles.

Vous avez déjà consulté les derniers numéros publiés; il nous serait donc très agréable de recueillir, dans un proche délai, vos impressions sur les modifications de Phytoma. Par la même occasion, vous pourriez nous suggérer toutes les améliorations que vous désireriez voir apporter à cette revue, pour lui permettre de mieux vous informer sur les différents problèmes phytosanitaires.

Le Chef de la Circonscription phytosanitaire des
"PAYS DE LA LOIRE"

G. RIBAUT.